

 _어린이 생물도감

: 2026 4 12 1:19



0015691



Flora of Baek-du-san (白頭山)
Aplacaeae
Aegopodium alpestre Ledeb.
Local Name 왜방풍
An-tu-nian, Yanbian, Jilin, China. 연도령, 연변조선족자치구, 길림성.
국가생물자원보존을 위해 상세기록을 작성하였습니다.
이도백령, 이도백령에서 서귀포로 가다가 관양으로 뺏기는 옛길
Collector: Seong-Hwan Cho, Joo-Hwan Kim, Chang-Kun Lim,
Bom-Bi Jin
Collection No. MC261
Coll. Date. 25 May, 2011
Herbarium of Hallym University (HUPU)

왜방풍 / *Aegopodium alpestre* Ledeb.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	산미나리속
과국명	산형과
과명	Umbelliferae
일반특징	<p>요약설명 : 산형과 여러해살이풀로 우리나라의 강원도를 기준으로 한 북쪽 지역에서 자란다. 중국, 일본, 몽골, 인도, 러시아에도 분포한다.</p> <p>분포지역 : ▶한국, 중국, 일본, 몽골, 인도, 러시아에 분포한다.▶강원도 이북에서 자란다.</p> <p>형태 : 여러해살이풀</p> <p>크기 : 높이가 30-70cm정도로 자란다.</p> <p>꽃색 : 백색</p> <p>개화기 : 8월</p> <p>뿌리에서 난 잎과 줄기 밑부분의 잎은 세모 모양이고 2~3회 삼출깃모양겹잎이다. 작은잎은 달걀 모양이다. 점점두에 쐐기모양이며 앞, 뒷면에 털이 없다. 또한 가장자리에 불규칙하고 깊은 톱니가 있거나 3개로 갈라진다. 윗부분의 잎은 잎자루가 없다.</p> <p>줄기나 가지 끝 또는 잎 달린 자리에 긴 꽃자루가 나오는데 그 끝에서 1~3개의 큰 우산모양꽃차례가 발달한다. 큰 줄기는 8~12개이다. 작은 우산모양꽃차례에는 10여 개의 꽃이 달린다. 단면은 오각형이고 모서리진 선은 가늘며 기름을 분비하는 관은 없다. 꽃은 8월에 하얀색으로 핀다.</p> <p>총포조각과 작은 총포는 없으며 암술대는 밑부분이 둥글다.</p> <p>열매는 달걀 같은 긴 타원 모양이다. 분과의 단면은 오각형이다.</p> <p>줄기는 곧게 서고 속이 비어 있다. 가느다란 기는줄기가 뻗으며 마디가 굽어진다.</p> <p>땅속줄기는 짧게 옆으로 자라고 기는줄기가 뻗어 번식하며 무리를 짓는다. 산골짜기 개울가 또는 습기가 많은 땅에서 자란다.</p>