

: 2025 11 7 12:47



왜졸방제비꽃 / Viola sacchalinensis H.Boissieu

구분	설명
생물 분 류	식물
속국명	제비꽃속
과국명	제비꽃과
과명	Violaceae
일반특징	요약설명: 제비꽃과 여러해살이풀로 우리나라의 함경남도 부전 고원 및 갑산에서 자란다. 중국, 러시아 극동부, 일본 등지에 분포한다. 분포지역: 한국, 중국, 러시아극동부, 일본 등지에 분포한다.함경남도 부전 고원 및 갑산에서 자란다. 형태: 여러해살이풀 크기: 개화기의 키는 2~5cm, 결실기의 키는 10~25cm 정도이다. 꽃색: 자주색,보라색 개화기: 5월,6월 뿌리에서 난 잎은 둥근 심장 모양 또는 신장 모양이다. 가장자리에 뭉뚝한톱니가 있으며 잎자루가 잎몸보다 2~3배 길다. 줄기잎은 잎자루가 짧으며턱잎이 가장자리에서부터 중간까지 갈라져 있다. 꽃은 5월에 자주색으로 피고 잎 달린 자리에 난다. 꽃받침조각은 좁은 창모양이며 끝이 날카롭고 가장자리가 밋밋하다. 뒤쪽으로 가늘게 튀어나온꽃뿔은 긴 타원 모양이다. 열매는 삭과이고 달걀 같은 타원 모양이며, 짧은 꽃자루에 달린 닫힌꽃에서 맺힌다. 이 때, 닫힌꽃은 다른 꽃과 꽃가루의 주고받음 없이 열매를 맺는 꽃을 말한다. 줄기는 뿌리와 줄기의 경계 부분에 몇 개씩 비스듬히 선다. 마르면 갈색점이생긴다.