



: 2026 2 23 11:44



용머리 / *Dracocephalum argunense* Fisch. ex Link

구분	설명
생물분류	식물
속국명	용머리속
과국명	꿀풀과

과명	Labiatae
일반특징	<p>요약설명 : 꿀풀과 여러해살이풀로 꽃을 감상하기 위해 기르기도 한다. 우리나라의 함경남도, 평안북도, 강원도 강릉시, 충청북도 단양군에서 자란다. 일본과 중국에서도 볼 수 있다.</p> <p>분포지역 : 일본, 중국 / 한국(함경남도; 평안북도; 강원도 강릉시; 충청북도 단양군)</p> <p>형태 : 숙근성 여러해살이풀로 관화식물이다.</p> <p>크기 : 높이 15~40cm</p> <p>꽃색 : 자주색</p> <p>개화기 : 6월, 7월, 8월</p> <p>잎은 마주나기하고 잎자루가 없거나 있다. 잎은 선 모양이고 끝이 둥똑하다. 곁면에 윤기가 있고 뒷면 맥 위에는 털이 있다. 가장자리가 밋밋하고 뒤로 말린다. 밑부분의 잎은 잎자루가 짧으며 달걀 모양이다. 가장자리에 톱니가 약간 있고 잎겨드랑이에서 몇 개의 잎들이 모여난다.</p> <p>꽃은 6~8월에 자주색으로 핀다. 입술모양처럼 생겼으며 줄기 끝에서 여러 개가 짧은 이삭꽃차례로 달린다. 꽃받침에는 퍼진 털이 있으며 굵은 맥이 도드라진다. 또한, 거의 중심까지 불규칙하게 5개로 갈라진다. 꽃받침조각은 끝이 바늘처럼 뾰족하고 조각 사이사이가 도드라진다. 꽃잎 전체는 입술 모양이고 꽃가루주머니와 더불어 곁에 털이 있다. 판통은 갑자기 굽어진다. 윗입술꽃잎의 끝은 약간 오목하고, 아랫입술꽃잎은 3개로 갈라지는데 그중 가운데 것이 가장 크고 자주색 점이 있다.</p> <p>열매는 분과이고 타원 모양이며 8~9월에 익는다.</p> <p>줄기는 곧게 서고 네모나며 아래로 굽어 있는 하얀 털이 있다. 또한 짧은 뿌리줄기에서 모여나기한다.</p> <p>잔뿌리는 여러 방향으로 뻗는다.</p> <p>식물이 썩어 만들어진 유기물이 많은 곳, 물이 잘 빠지는 곳, 진흙이 비교적 적게 섞인 보드라운 땅이 적합하다. 충분한 빛이 필요하며 15~25°C에서 잘 자란다. 포기나누기를 하여 번식시킨다.</p>