

영남대생물학과



FLORA OF KOREA

Hemerocallis flava L. 황조롱이
(조롱아)

Loc. Kongsongchuldo, Moryong-shi, Moryong-gun, Moryong-saeng Provincial Park
경상북도 문경시 문경읍 문경생태 도립공원
해발고도—조롱아—조롱아

Note
Date July 21, 1999
Coll. Kyung Cho.
DNA & Tissue No.
Youngnam University Herbarium (YNUH)

No. 99-1123

데이터 출처: 국립수목원 어린이 생물도감 API - page 1 of 2

| 구분 | 설명 |
|------|---|
| 생물분류 | 식물 |
| 속국명 | 원추리속 |
| 과국명 | 백합과 |
| 과명 | Liliaceae |
| 일반특징 | <p>요약설명 : 백합과 여러해살이풀로 잎이나 꽃을 감상하기 위해 기르기도 한다. 한국, 중국, 일본 등에 분포한다.</p> <p>분포지역 : ▶한국, 중국, 일본 등지에 분포한다.</p> <p>형태 : 속근성 다년초 관엽, 관화식물이다.</p> <p>크기 : 꽃대는 높이 1m내외.</p> <p>꽃색 : 주황색</p> <p>개화기 : 7월,8월,6월</p> <p>잎은 칼처럼 생기고 밑에서 두 줄로 마주나기 한다. 끝이 둥글게 뒤로 젖혀지며 하얀빛이 도는 초록색이다.꽃대는 끝에서 짧은 가지가 갈라진다. 6~8월이 되면 6~8개의 꽃이 총상꽃차례로 달린다. 꽃을 감싸는 작은 잎은 선 같은 창 모양이다. 또한 윗부분의 것은 가장자리가 얇은 막처럼 되어 있다. 꽃자루는 밑부분이 꽃대축에 붙어 있다. 꽃은 등황색이다. 내꽃덮이는 긴 타원 모양이고 둔두이다. 가장자리는 얇은 막처럼 되어 있다. 수술은 6개이고 판통 위 끝에 달리며 꽃잎보다 짧다. 꽃가루주머니는 선모양이고 노란색이다. 꽃은 아침에 피었다가 저녁에 시들지만 계속해서 다음 꽃이 10송이씩 핀다. 열매는 삭과고 넓은 타원 모양이며 3각으로 벌어진다. 검은 씨앗이 들어 있다.</p> <p>줄기는 잎과 따로 구분되지 않는다.</p> <p>뿌리는 가늘며 황갈색이다. 끝부분이 부풀어 양쪽이 뾰족한 원기둥 모양의 덩이뿌리가 생긴다.</p> <p>해가 잘 들고 수분을 머금고 있는 기름진 땅과 식물이 썩어 만들어진 유기물이 많은 땅이 적합하다. 구릉지 같은 경사진 곳에서도 잘 자란다. 다소 습기가 많은 곳에 무리를 이루며 자란다. 충분한 빛이 필요하고 지붕이 없는 보통 땅에서 겨울을 난다. 16~30℃에서 잘 자란다. 씨앗을 뿌리거나 포기 나누기를 하여 번식시킨다. 시름을 잊게 해준다는 중국의 고사로 인하여 흰초(), 또는 망우초()라고도 부른다. 옛부터 봄의 대표적인 산나물의 하나였는데 이때는 '넙나물', '넙나물'이라고 따로 이름이 있었다.</p> |