

_어린이 생물도감

: 2026 2 8 6:37



으아리 / *Clematis terniflora* var. *mandshurica* (Rupr.) Ohwi

구분	설명
생물분류	식물
속국명	으아리속
과국명	미나리아재비과

과명	Ranunculaceae
일반특징	<p>요약설명 : 미나리아재비과 낙엽 활엽 덩굴성 식물로 우리나라의 함경북도부터 백두대간에 분포하며, 황해도에서도 볼 수 있다. 중국과 극동러시아에도 분포한다.</p> <p>분포지역 : 중국, 극동러시아; 함경북도부터 백두대간에 분포. 황해도에도 분포.</p> <p>형태 : 낙엽 활엽 덩굴성 식물.</p> <p>크기 : 길이 2m.</p> <p>꽃색 : 백색</p> <p>개화기 : 5월, 6월, 7월, 8월, 9월</p> <p>잎은 마주나기하고 5~7개의 작은 잎으로 구성된 깃모양겹잎이다. 달걀 모양이며, 끝이 짧고 뾰족하다. 또한, 원저거나 밑부분이 넓고 뾰족한 모양이다. 양면에 털이 없고 가장자리에 톱니가 없다. 잎자루는 구부러져서 덩굴손과 같은 역할을 한다.</p> <p>꽃은 5월 말~9월 초에 하얀색으로 피고, 가지 끝과 잎겨드랑이의 취산꽃차례에 10~30개가 달린다. 꽃받침조각은 4~5개이고, 거꾸로 세운 달걀 같은 긴 타원 모양이다.</p> <p>열매는 수과고 달걀 모양이다. 꼬리처럼 생긴 암술대에는 하얀 털이 있다. 8월 말~11월 초에 익는다.</p> <p>줄기는 나무처럼 단단해지지 못하고 겨울에 말라죽는다.</p> <p>수염뿌리가 굽다.</p> <p>들과 산기슭에서 자란다.</p>