

: 2025 11 5 5:52



이질풀 / Geranium thunbergii Siebold & Zucc.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	쥐손이풀속
과국명	쥐손이풀과

과명	Geraniaceae
일반특징	요약설명 : 쥐손이풀과 여러해살이풀로 제주도, 전라남도, 경상도, 강원도, 경기도, 황해도, 함경남도에서 자란다. 일본에도 분포한다. 분포지역 : 일본에 분포한다.제주, 전남, 경남, 경북, 강원, 경기, 황해, 함남에 야생한다. 형태 : 여러해살이풀 크기 : 길이 50cm정도. 꽃색 : 붉은색,자주색 개화기 : 9월,8월 잎은 마주나기하며 손바닥 모양처럼 3~5개로 갈라진다. 양면에 검은색 무늬가 있다. 겉면에는 갈라진 털이 있으며 뒷면 맥 위에는 비스듬하게 선 곱슬털이 있다. 잎의 갈라진 조각은 거꿀달걀모양이고 둔두이다. 얕게 3개로 갈라지며 윗부분에 불규칙한 톱니가 있다. 잎자루가 있으며, 턱잎은 서로 떨어져 있다. 꽃은 8~9월에 피고 연한 붉은색, 홍자색 또는 하얀색이다. 꽃줄기에서 2개의 꽃자루가 갈라져 각각 1개의 꽃이 달린다. 꽃자루와 꽃받침에는 짧은 털과, 분비샘이 발달한 긴 털이 있다. 씨방에도 털이 있다. 열매는 삭과이고 5개로 갈라져서 위로 말려 있다. 5개의 씨앗이 들어 있다. 줄기는 옆으로 비스듬하게 또는 땅을 기듯이 뻗어 나간다. 위로 퍼진 털이 있으며 곳곳에 마디가 있다. 뿌리는 여러 개로 갈라진다. 수분을 적당히 머금으면서도, 물이 잘 빠지는 땅이 적합하다. 진흙이 비교적 적게 섞인 보드라운 흙이나 유기물이 충분히 섞인 기름진 땅에서 잘 자란다. 씨앗을 뿌리거나 포기나누기를 하여 번식시킨다.