



이화명나방 / *Chilo suppressalis* (Walker, 1863)

구분	설명
생물분류	곤충
속국명	
과국명	포충나방과

과명	Crambidae
일반특징	<p>홀눈이 발달되었고 이마는 양 끝이 뾰족한 원기둥 모양으로 튀어 나와 있다. 아랫입술수염은 겹눈 지름의 3~3.5배로 길고 앞쪽으로 뻗어 있다. 앞날개는 황회색이고 흑갈색의 비늘 조각이 흩어져 있으며 가장자리에는 검은 점 7개가 있다. 뒷날개는 흰색 또는 황갈색이다.</p> <p>암컷의 생식기에 붙어 있는 것들은 대칭을 이루고 있으며 양 팔은 길다. 삽입기는 길고 배에 붙어 있는 기관도 길게 발달되어 있다.</p> <p>번데기는 처음에 갈색이지만 성충이 될 때 짙은 어두운 갈색으로 변한다. 애벌레의 머리는 갈색이다.</p> <p>첫 번째 시기에 태어난 애벌레는 잎집을 파고 들어가 해를 입혀 갈색으로 변하게 만든다. 두 번째 시기에 태어난 애벌레는 곡식에 알이 배는 시기나 이삭이 잎 밖으로 나오는 시기에 피해를 주게 되는데, 이 때 피해를 받은 곡식은 이삭이 나오더라도 말라 죽는다.</p> <p>애벌레는 알을 낳은 후 벼줄기 속을 갇아먹다가 성장을 마치면 벼짚 줄기 속이나 벼를 베고 남은 밀 부분에서 겨울을 보낸다. 그 후 애벌레는 탈출 구멍을 만들어 이동하고, 그 근처에서 번데기가 된다.</p>