



일색고사리 / *Arachniodes standishii* (T.Moore) Ohwi

구분	설명
생물분류	식물
속국명	쇠고사리속
과국명	면마과

과명	Dryopteridaceae
일반특징	<p>요약설명 : 면마과 상록다년초로 울릉도와 제주도에서 자란다.</p> <p>분포지역 : 울릉도와 제주도에서 자란다.</p> <p>형태 : 상록다년초</p> <p>크기 : 높이가 1m에 이른다.</p> <p>꽃색 : 분홍색</p> <p>개화기 : 6월</p> <p>잎자루의 길이는 잎몸의 절반 정도이고, 색은 연한 초록색이거나 벗짚색이다. 또한, 앞쪽에 홈이 파여 있고 밑부분은 갈색 또는 황갈색 비늘조각이 촘촘하게 퍼져 있다. 그러나 윗부분은 선모양 비늘 조각이 드문드문 돌아 있다. 잎몸은 긴 타원 같은 달걀 모양이고 끝이 뾰족하며 3회 깃털 모양으로 갈라진다. 깃털 모양 조각은 12~15쌍이고 짧은 대가 있다. 흠씨주머니 무리가 달리지 않은 것은 앞뒤의 색이 같다. 겉면에는 비늘조각이 거의 없지만 뒷면에는 드문드문 있으며 갈라진 조각에는 뾰족한 톱니가 있다. 흠씨주머니 무리는 잎몸 밑부분에 달리고 맨 나중 조각에 두 줄로 배열된다. 흠씨주머니 무리를 덮고 있는 막은 둥근 콩팥모양이고 가장자리가 밋밋하다. 뿌리줄기는 연필 굵기 정도이고 짧게 옆으로 뻗으면서 잎이 촘촘하게 달린다. 계곡 숲 속의 습지에서 자란다.</p>