



: 2026 2 8 6:39



자주가는오이풀 / *Sanguisorba tenuiflora* var. *purpurea* Trautv. & Mey.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	오이풀속
과국명	장미과
과명	Rosaceae
일반특징	<p>요약설명 : 장미과 여러해살이풀로 전국의 산과 들에서 자란다. 북한, 중국, 러시아 극동부에도 분포한다.</p> <p>분포지역 : 전국 산야에서 자라며 북한과 중국, 러시아극동부에도 분포한다.</p> <p>형태 : 여러해살이풀</p> <p>크기 : 높이가 1m 정도로 자란다.</p> <p>꽃색 : 붉은색</p> <p>개화기 : 9월, 8월, 7월</p> <p>뿌리에서 난 잎은 1회 깃모양겹잎이다. 밑부분에 턱잎 같은 작은 잎이 있다.</p> <p>작은 잎은 11~15개이고 달걀 모양 또는 타원 모양이며 원두 심장저이다.</p> <p>겉면은 초록색이고 뒷면에는 하얀빛이 돈다. 가장자리에 톱니가 있으며 털이 없다. 작은 잎자루는 없거나 짧다. 줄기잎도 이와 비슷하지만 뒷면 밑부분에 가끔 하얀 털이 나타난다.</p> <p>꽃은 7~9월에 진한 붉은색으로 위에서부터 핀다. 꽃이삭은 줄기 끝과 가지 끝에 달리며 곧게 서거나 끝이 조금 처진다. 꽂자루에 가끔 털이 나 있다.</p> <p>꽃잎은 없으며 꽃받침조각과 수술은 각각 4개이다. 수술이 꽃받침보다 길며 꽃가루주머니는 검은색이다.</p> <p>열매는 수과고 거꿀달걀모양이며, 날개가 있다. 8~9월에 익는다.</p> <p>줄기는 곧게 서고 털이 없다. 뿌리는 갈라지며 양 끝이 뾰족한 원기둥 모양이 되고, 옆으로 퍼진다.</p> <p>숲 가장자리 및 낮은 지대의 약간 습기가 있는 곳에 자란다. 가는오이풀과 오이풀의 자연적인 교배로 인해 생겨났다. 잎, 꽃차례의 특징이 가는오이풀과 비슷하지만 꽃이 진한 붉은색인 것이 차이점이다.</p>