

: 2025 11 5 7:38



자주방가지똥 / Lactuca sibirica (L.) Benth. ex Maxim.

구분	설명
생물 분 류	식물
속국명	왕고들빼기속
과국명	국화과

과명	Compositae
일반특징	요약설명: 국화과 여러해살이풀로 우리나라의 부전고원에서 백두산지역을 거쳐 북부 지방에까지 분포되어 있다. 분포지역: 부전고원에서 백두산지역을 거쳐 북부지방에까지 분포되어 있다. 형태: 여러해살이풀 크기: 높이가 60~90cm이다. 꽃색: 파란색 개화기: 8월,7월 뿌리에서 난 잎과 밑부분의 잎은 꽃이 필 때 떨어진다. 가운데 달린 잎은 긴 타원 같은 창 모양 또는 긴 타원 모양이다. 끝이 길게 뾰족해지고 양면에 털이 없다. 또한 가장자리는 갈라지거나 톱니가 있으며, 밑부분이 줄기를 감싼다. 꽃은 7~8월에 하늘색으로 피고 머리모양꽃차례는 엉성하게 꽃대 끝이 평평한 모양으로 달린다. 총포는 통 모양이고 밑에 총포조각이 있다. 총포조각은 3줄로 배열되며 자줏빛이 돈다. 바깥쪽 조각은 달걀 같은 창모양이며, 가운데 조각 및 안쪽 조각과 더불어 끝이 뭉뚝하다. 열매는 수과고 검은색이다. 또한 양 끝이 뾰족하고 평평하며, 긴 타원모양이다. 열매 위쪽 끝부분에 나온 털 뭉치는 하얀색이다.