

 _어린이 생물도감

: 2025 5 2 11:40



잣까마귀 / Nucifraga caryocatactes

구분	설명
생물분류	야생동물

속국명	
과국명	까마귀과
과명	Corvidae
일반특징	짙깃기철에는 주로 높고 험한 산 속에서 살며, 겨울철에는 들판으로 이동하난. 둥지는 큰 나무의 줄기 가까이에 있는 가지 위에 작은 나뭇가지, 이끼류 등을 흠으로 굳혀 밥그릇 모양으로 만든다. 알을 낳는 시기는 3-4월이다. 알은 엷은 녹색 또는 엷은 푸른 녹색 바탕에 엷은 녹색갈색의 얼룩점이 있으며, 3~4개 낳는다. 암컷과 수컷 모두 이마에서 뒷목까지 진한 초콜릿색이며 눈앞은 어두운 흰색이다. 목 옆, 어깨 깃, 등, 허리는 초콜릿색으로 각 깃 끝의 중앙에는 물방울 모양의 흰색 얼룩무늬가 있다. 위꼬리덮깃은 남색 광택을 띤 검은 갈색으로 각 깃 끝에는 흰색의 작은 얼룩무늬가 있다. 꼬리는 남색을 띤 녹색의 광택이 있는 검은 갈색으로 끝에는 흰색 띠가 있다. 귀깃과 턱 아래 부위는 초콜릿색으로 각 깃털의 중앙에는 긴 물방울 모양의 흰색 얼룩무늬가 있고, 턱밑은 초콜릿색으로 흰색의 축이 되는 반점이 있다. 가슴과 배는 초콜릿색이며 각 깃 끝에는 큰 달걀 모양의 흰색 얼룩무늬가 있다. 아래꼬리덮깃은 흰색이다. 부리와 다리는 검은색이다.