



재썩 / *Descurainia sophia* (L.) Webb ex Prantl

| 구분 | 설명 |
|------|------|
| 생물분류 | 식물 |
| 속국명 | 재썩속 |
| 과국명 | 십자화과 |

| | |
|------|--|
| 과명 | Cruciferae |
| 일반특징 | <p>요약설명 : 십자화과 2년생 초본으로 전국 각지에 분포한다. 분포지역 : 전국 각지에 분포한다. 형태 : 2년생 초본 크기 : 높이 30~70cm 꽃색 : 백색 개화기 : 6월,5월 잎은 잎자루가 없고 2~3회 깃털 모양으로 갈라진다. 맨 나중 조각은 거꿀피침모양이고 톱니가 거의 없다. 꽃은 5~6월에 하얀색으로 피며 가지 끝이나 줄기 끝에 총상꽃차례로 달린다. 꽃받침조각은 선 같은 긴 타원 모양이다. 꽃잎은 좁은 주걱 모양이고 길이는 꽃받침과 같거나 약간 짧다. 수술은 6개인데 그중 4개가 길고 2개가 짧다. 1개의 암술은 꽃잎 위로 더 나온다. 암술이 자라서 열매가 된다. 열매는 장각과고 약간 휘어져 있으며 씨앗이 들어있는 곳이 조금 튀어 올라온다. 열매는 옆으로 퍼진 작은 열매자루에 위를 향해 달린다. 씨앗은 갈색이고 긴 타원 모양이며 15~20개가 한 줄로 배열된다. 줄기는 곧게 자라고 전체적으로 하얀 털이 나 있다. 윗부분에서 가지가 갈라진다. 낮은 지대의 빈 땅에서 자란다. 전체적으로 하얀 털이 꼼꼼하게 나며 회백색을 띤다. 유럽에서 들어온 식물로 여겨진다.</p> |