



: 2026 2 15 9:33



절국대 / *Siphonostegia chinensis* Benth.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	절국대속
과국명	현삼과
과명	Scrophulariaceae
일반특징	<p>요약설명 : 현삼과 반기생 일년초로 한국, 중국, 일본, 러시아에 분포한다.</p> <p>분포지역 : 한국, 중국, 일본, 러시아에 분포한다.</p> <p>형태 : 반기생 일년초.</p> <p>크기 : 높이가 30-60cm정도로 자란다.</p> <p>꽃색 : 노란색</p> <p>개화기 : 8월, 7월</p> <p>잎은 줄기의 중간 아랫부분에서도 마주나기하지만 윗부분에서는 어긋난다.</p> <p>깃털 모양으로 갈라지며 잎자루는 짧거나 없다. 윗부분의 잎은 3개로 갈라지면 갈라진 조각은 선 같은 창 모양이다. 1~3개의 텁니가 있다.</p> <p>꽃은 7~8월에 노란색으로 피고 잎겨드랑이에 1개씩 옆을 향해 달려 이삭 모양이 된다. 꽃받침통은 통 모양이고 튀어나온 맥이 있다. 꽃을 보호하는 작은 잎은 짧다. 꽃받침은 튀어나온 10맥에 까칠한 털이 있고 5개의 창 모양 조각이 있다. 꽃잎 전체는 입술 모양이다. 윗입술꽃잎은 곧고 흥자색 얼룩이 있으며 곁에 털이 있다. 아랫입술꽃잎은 끝이 3개로 갈라지고 가운데 조각이 크고 둥글며 곁에 털이 있다. 수술은 4개이지만 2개가 길다.</p> <p>열매는 삭과고 창 모양이다. 털이 없으며 꽃받침에 싸여있다. 8~9월에 익어 두 쪽으로 터진다. 씨앗은 달걀 모양이다.</p> <p>줄기는 곧게 서고 연한 자줏빛을 띤다. 다소 각이 졌으며 분비샘이 발달한 털과 하얀색의 부드러운 털이 촘촘하게 나 있다. 윗부분에서 가지가 갈라진다.</p> <p>산비탈의 햇빛이 드는 풀밭에서 자란다.</p>