

 어린이 생물도감

: 2026 4 11 9:57



절국대 / *Siphonostegia chinensis* Benth.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	절국대속
과국명	현삼과
과명	Scrophulariaceae
일반특징	<p>요약설명 : 현삼과 반기생 일년초로 한국, 중국, 일본, 러시아에 분포한다. 분포지역 : 한국, 중국, 일본, 러시아에 분포한다. 형태 : 반기생 일년초. 크기 : 높이가 30-60cm정도로 자란다. 꽃색 : 노란색 개화기 : 8월, 7월</p> <p>잎은 줄기의 중간 아랫부분에서도 마주나기하지만 윗부분에서는 어긋난다. 깃털 모양으로 갈라지며 잎자루는 짧거나 없다. 윗부분의 잎은 3개로 갈라지면 갈라진 조각은 선 같은 창 모양이다. 1~3개의 톱니가 있다. 꽃은 7~8월에 노란색으로 피고 잎겨드랑이에 1개씩 옆을 향해 달려 이삭 모양이 된다. 꽃받침통은 통 모양이고 튀어나온 맥이 있다. 꽃을 보호하는 작은 잎은 짧다. 꽃받침은 튀어나온 10맥에 까칠한 털이 있고 5개의 창 모양 조각이 있다. 꽃잎 전체는 입술 모양이다. 윗입술꽃잎은 곧고 홍자색 얼룩이 있으며 겹에 털이 있다. 아랫입술꽃잎은 끝이 3개로 갈라지고 가운데 조각이 크고 둥글며 겹에 털이 있다. 수술은 4개이지만 2개가 길다. 열매는 삭과고 창 모양이다. 털이 없으며 꽃받침에 싸여있다. 8~9월에 익어 두 쪽으로 터진다. 씨앗은 달걀 모양이다.</p> <p>줄기는 곧게 서고 연한 자줏빛을 띤다. 다소 각이 졌으며 분비샘이 발달한 털과 하얀색의 부드러운 털이 촘촘하게 나 있다. 윗부분에서 가지가 갈라진다. 산비탈의 햇빛이 드는 풀밭에서 자란다.</p>