



제비꽃 / *Thesium chinense* Turcz.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	제비꽃속
과국명	단향과

<b>과명</b>	Santalaceae
<b>일반특징</b>	<p>요약설명 : 단향과 다년생 반기생초로 전국 각지에 분포한다. 일본 오키나와, 중국에서 볼 수 있다.</p> <p>분포지역 : ▶일본, 오키나와, 중국에 분포하다.▶전국에 분포한다.</p> <p>형태 : 다년생 반기생초.</p> <p>크기 : 높이 10~25cm.</p> <p>꽃색 : 백색</p> <p>개화기 : 7월,8월</p> <p>잎은 어긋나고 선모양이다. 끝이 뾰족하고 굵은 맥이 있으며 가장자리가 밋밋하고 때로는 3개로 갈라진다. 하얀빛이 도는 초록색이고 잎자루가 없다.</p> <p>꽃은 7~8월에 하얀색으로 피고 1개씩 달린다. 매우 짧은 대가 있거나 없다.</p> <p>또한, 꽃은 암술과 수술을 모두 갖고 있는 양성이다. 꽃잎은 없고 꽃받침은 아랫부분이 짧은 통 모양이며, 윗부분은 4~5갈래로 갈라진다. 꽃받침조각은 달걀 같은 긴 타원 모양이며, 아랫부분에 4~5개의 수술이 있다. 씨방은 꽃받침 아래에 있고 1개의 암술대가 있다.</p> <p>열매는 타원 같은 둥근 공 모양이고 끝에 꽃덮이조각이 있으며 초록색이다. 그 속에 1개의 씨앗이 들어 있고 겉은 맥이 튀어나와 그물처럼 된다.</p> <p>줄기는 곧게 서고 아랫부분에서 여러 갈래가 갈라져 모여나지만, 1개인 것도 있다. 전체적으로 털이 없고 백록색을 띤다.</p> <p>햇빛이 잘 드는 풀밭에서 자란다. 씨앗으로 번식한다. 다른 식물의 뿌리에 기생하지만 정상적인 영양체를 가진 여러해살이풀로서 양지에서 자란다.</p>