

: 2025 11 7 9:06



제비꿀 / Thesium chinense Turcz.

구분	설명
생 <del>물분</del> 류	식물
속국명	제비꿀속
과국명	단향과

과명	Santalaceae
일반특징	요약설명: 단향과 다년생 반기생초로 전국 각지에 분포한다. 일본 오키나와, 중국에서 볼 수 있다. 분포지역: ▶일본, 오키나와, 중국에 분포하다.▶전국에 분포한다. 형태: 다년생 반기생초. 크기: 높이 10-25cm. 꽃색: 백색 개화기: 7월,8월 잎은 어긋나고 선모양이다. 끝이 뾰족하고 굵은 맥이 있으며 가장자리가 밋밋하고 때로는 3개로 갈라진다. 하얀빛이 도는 초록색이고 잎자루가 없다. 꽃은 7~8월에 하얀색으로 피고 1개씩 달린다. 매우 짧은 대가 있거나 없다. 또한, 꽃은 암술과 수술을 모두 갖고 있는 양성이다. 꽃잎은 없고 꽃받침은 아랫부분이 짧은 통 모양이며, 윗부분은 4~5갈래로 갈라진다. 꽃받침조각은 달걀 같은 긴 타원 모양이며, 아랫부분에 4~5개의 수술이 있다. 씨방은 꽃받침 아래에 있고 1개의 암술대가 있다. 열매는 타원 같은 둥근 공 모양이고 끝에 꽃덮이조각이 있으며 초록색이다. 그속에 1개의 씨앗이 들어 있고 겉은 맥이 튀어나와 그물처럼 된다. 줄기는 곧게 서고 아랫부분에서 여러 갈래가 갈라져 모여나지만, 1개인 것도 있다. 전체적으로 털이 없고 백록색을 띤다. 햇빛이 잘 드는 풀밭에서 자란다. 씨앗으로 번식한다. 다른 식물의 뿌리에 기생하지만 정상적인 영양체를 가진 여러해살이풀로서 양지에서 자란다.