



제비나비 / *Papilio bianor* Cramer, 1777

구분	설명
생물분류	곤충
속국명	호랑나비속
과국명	호랑나비과

과명	Papilionidae
일반특징	<p>산제비나비와 비슷하게 생겼지만 몇 가지 차이점이 있다. 제비나비는 이성에게 자신을 알리는 표시와 뒷날개 아랫면 가장자리에 있는 반달무늬가 작다. 또한, 앞날개 아랫면의 흰 띠가 날개 뒷 가장자리에서 출발하여 위로 올라가면서 점점 넓어진다. 그리고 뒷날개 아랫면에 가장자리를 따라서 흰 띠가 없다. 이와 같은 차이점으로 산제비나비와 구별할 수 있다.</p> <p>수컷의 앞날개 윗면에는 암컷에게 자신을 알리는 표시가 있는데, 이것은 검은 융단 모양이다. 봄형이 여름형보다 작다. 부화한 애벌레는 몸 색깔이 4령까지는 청록색이며, 성장을 마치면 녹색으로 변한다. 주로 잎 표면에서 생활한다.</p> <p>전국적으로 산지의 계곡 주변에 서식한다. 1년에 2~3번 볼수 있는데, 봄형은 4~6월, 여름형은 7~8월에 나타난다. 수컷의 계곡이나 산 꼭대기에서 나비길을 만들며, 계곡의 축축한 땅에서 모여 물을 먹는다. 산지의 달맞이꽃, 엉겅퀴 등 다양한 꽃에서 꿀을 먹는다. 암컷은 어두운 장소에 있는 먹이 식물의 잎 뒷면에 날개로 알을 낳는다. 번데기의 모습으로 겨울을 난다.</p>