



좁고사리 / *Pleurosoriopsis makinoi* (Maxim. ex Makino) Fomin

구분	설명
생물분류	식물
속국명	좁고사리속
과국명	고사리과

과명	Pteridaceae
일반특징	<p>요약설명 : 고사리과 상록성에 가까운 초본으로 한라산, 오대산 비로봉의 능선 및 설악산 오색계곡의 바위걸, 개성근처에서 자란다.</p> <p>분포지역 : 한라산, 오대산 비로봉의 능선 및 설악산 오색계곡의 바위걸, 개성근처에서 자란다.</p> <p>형태 : 상록성에 가까운 초본</p> <p>크기 : 높이 50cm</p> <p>꽃색 : 녹색</p> <p>개화기 : 9월, 10월, 8월</p> <p>잎자루는 잎몸보다 짧거나 거의 같다. 잎몸은 2회 깃털 모양으로 갈라지며 양면에 갈색 털이 있다. 깃털 모양 조각은 3~5쌍이고 비스듬히 퍼지며 짧은 대가 있다. 끝이 뭉뚝하고 약간 갈라진다. 갈라진 조각은 둔두 또는 원두이고 긴 타원 모양이다. 밋밋하거나 2~3개로 얇게 갈라진다.</p> <p>흫씨주머니 무리는 잎맥의 뒷면을 따라 길게 달리며, 덮여 있는 막은 없다. 뿌리줄기는 이끼 틈으로 기어가듯 뻗는다.</p> <p>항상 푸른 상태에 가까우나 여름에 잠깐 잎이 마른다. 좁고사리라는 이름은 작은 고사리라는 뜻이다.</p>