

_어린이 생물도감

: 2026 2 4 7:25



좀깨잎나무 / *Boehmeria spicata* (Thunb.) Thunb.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	모시풀속
과국명	쐐기풀과

과명	Urticaceae
일반특징	<p>요약설명 : 쐐기풀과 낙엽 활엽 반관목으로 평안남도 및 강원도를 기준으로 한 남쪽지역에서 자란다. 중국과 일본에도 분포한다.</p> <p>분포지역 : 중국, 일본; 평안남도 및 강원도 이남.</p> <p>형태 : 낙엽 활엽 반관목</p> <p>크기 : 높이 50 ~ 100cm.</p> <p>꽃색 : 녹색</p> <p>개화기 : 8월, 7월</p> <p>잎은 마주나기하고 네모난 달걀 모양이다. 끝이 갑자기 꼬리처럼 길어지고 밑부분이 좁으며 뾰족하다. 곁면에 갈라진 털이 있고 뒷면은 맥 위에만 털이 있다. 가장자리에 큰 톱니가 5~6개씩 있다. 잎자루는 붉은빛이 돈다. 같은 마디에 달리는 잎은 한쪽이 길고 한쪽이 짧은 것이 많다.</p> <p>꽃은 암꽃과 수꽃이 한 그루에 달리지만 드물에 각각 다른 그루에 달리는 것도 있다. 7~8월에 피고, 암꽃차례는 줄기 윗부분의 잎겨드랑이에, 수꽃차례는 밑부분의 잎겨드랑이에 달린다. 수꽃은 꽃덮이조각과 수술이 각각 4개씩 있고 암꽃은 여러 개가 모여 한군데에 달린다. 통 모양의 꽃덮이 안에 1개의 씨방이 있으며 암술대도 1개이다.</p> <p>열매는 수과고 긴 거꿀달걀모양이지만 여러 개가 모여 달리기 때문에 둥글게 보인다. 긴 암술대가 남아 있으며 9~10월에 익는다. 열매 끝에 털이 있다.</p> <p>줄기는 붉은 빛이 돌며 털이 있으나 점점 사라진다. 가지는 가는 편이고 겨울을 나면서 끝부분이 말라 죽는다.</p> <p>햇빛이 잘 드는 양지이면서도 산골짜기 시내 근처의 돌담이나 숲 가장자리에 무리지어 자란다. 씨앗을 뿌리거나 꺽꽂이를 하여 번식시킨다.</p>