

: 2025 12 13 2:13



좀꿩의다리 / Thalictrum kemense var. hypoleucum (Siebold & Zucc.) Kitag.

구분	설명
생물 분 류	식물
속국명	꿩의다리속

과국명	미나리아재비과
과명	Ranunculaceae
일반특징	요약설명: 미나리아개비과 여러해살이풀로 전국 각지의 산과 들에서 자란다. 중국, 몽골, 사할린, 천도 열도, 일본에 분포한다. 분포지역: ▶한국, 중국, 몽골, 사할린, 천도 열도, 일본에 분포한다.▶전국 각지의 산야에서 자란다. 형태: 여러해살이풀 크기: 높이 40~120cm 정도로 자란다. 꽃색: 노란색,녹색 개화기: 7월,8월 잎은 어긋나고 2~3회 삼출겹잎이며 깃털 모양으로 갈라진다. 잎자루는 짧거나 없다. 턱잎에 물결 모양의 톱니가 있으며 밑부분에는 작은잎턱잎이 있다. 작은 잎은 긴 타원 모양, 거꿀달걀모양 또는 세모난 거꿀달걀모양이며 끝이 2~3개로 갈라진다. 원저 또는 심장저고 끝이 뾰족하다. 앞, 뒷면에 털이 없고 뒷면은 분처럼 하얀색을 띤다. 잎자루의 밑부분은 줄기를 감싼다. 7~8월이 되면 황록색 꽃이 큰 원뿔모양꽃차례에 달린다. 꽃받침조각은 3~4개이고 꽃잎처럼 생겼으며 빨리 떨어진다. 3개의 맥이 있고 긴 타원 모양이다. 꽃잎이 없고 수술은 10~17개로 많은 편이며 수술대 끝에 꽃가루주머니가 달린다. 암술은 2~6개이다. 열매는 수과고 거꿀달걀모양이다. 날개처럼 생긴 8개의 모가 진 선이 있다. 9월에 익는다. 줄기는 곧게 서고 털이 없으며 모가 진 선이 있다. 윗부분에서 가지가 갈라씨s다. 햇볕이 잘 드는 풀밭이나 숲 가장자리에서 자란다.