

 어린이 생물도감

: 2026 6 21 2:59



좁분버들 / *Salix rorida* var. *roridaeformis* (Nakai) Ohwi

구분	설명
생물분류	식물
속국명	버드나무속
과국명	버드나무과
과명	Salicaceae
일반특징	<p>요약설명 : 버드나무과 낙엽 활엽 교목으로 우리나라의 강원도 설악산을 기준으로 하여 북쪽 지역에서 자란다. 일본, 사할린에 분포한다.</p> <p>분포지역 : 강원(설악산) 이북에 나며 일본, 사할린에 분포한다.</p> <p>형태 : 낙엽활엽 교목이다.</p> <p>크기 : 높이 10m에 달한다.</p> <p>꽃색 : 백색</p> <p>개화기 : 4월</p> <p>잎은 창 모양으로서 양끝이 뾰족하며 작은 톱니가 있다. 겉면은 초록색이고 뒷면은 하얀빛을 띠며 처음에는 털이 있지만 점점 사라진다. 잎자루가 있다. 어린 잎은 안으로 말려 있다.</p> <p>꽃은 암꽃과 수꽃이 각각 다른 그루에 달린다. 4월에 피고 꼬리모양꽃차례를 이룬다. 수술은 2개, 꿀샘은 1개이다. 씨방은 달걀 모양으로 네모나며 암술머리는 2개이다.</p> <p>열매는 삭과고 달걀 모양이며 5월에 익는다.</p> <p>어린 가지는 노란색이고 햇빛을 받은 부분은 붉은색이다. 보통 하얀 가루로 덮여 있다.</p> <p>700~1300m의 골짜기나 하천 주변에서 자란다.</p>