



좁쇠고사리 / *Arachniodes sporadosora* (Kunze) Nakaike

| 구분 | 설명 |
|------|-------|
| 생물분류 | 식물 |
| 속국명 | 쇠고사리속 |
| 과국명 | 면마과 |

| | |
|------|---|
| 과명 | Dryopteridaceae |
| 일반특징 | <p>요약설명 : 면마과 상록다년초로 제주도에서 자란다.</p> <p>분포지역 : 제주도에서 자란다.</p> <p>형태 : 상록다년초이다.</p> <p>크기 : 꽃대는 높이 50-130cm, 지름 6-10mm</p> <p>꽃색 : 갈색</p> <p>개화기 : 8월,9월,10월</p> <p>잎자루는 앞면에 흠이 나 있고 비늘조각이 드문드문 달려 있다. 밑부분과 뿌리줄기에 달린 비늘조각은 가장자리가 밋밋하다. 잎몸은 달걀 모양이고 3회 깃털 모양으로 갈라진다. 깃조각은 긴 타원 모양이며 점점 좁아져서 뾰족해진다. 꼭대기의 깃털 모양 조각은 발달하지 않는다. 잔깃조각은 대가 있으며 털이 없다. 표면에 윤기가 나며 톱니 끝이 까락처럼 뾰족하다.</p> <p>홀씨주머니 무리는 잎몸 윗부분의 잔깃조각에 두 줄로 달린다. 홀씨주머니 무리를 덮고 있는 막은 둥근 콩팥모양이며 가장자리가 밋밋하고 털이 없다.</p> <p>뿌리줄기는 땅 가까이에서 짧게 뻗으며 잎이 다닥다닥 달린다.</p> <p>상록활엽수 숲에서 자란다.</p> |