



좁우드풀 / *Woodsia intermedia* Tagawa

| 구분 | 설명 |
|------|------|
| 생물분류 | 식물 |
| 속국명 | 우드풀속 |
| 과국명 | 면마과 |

| | |
|------|--|
| 과명 | Dryopteridaceae |
| 일반특징 | <p>요약설명 : 면마과 여러해살이풀로 우리나라의 중부지방을 기준으로 한 북쪽 지역에서 자란다.</p> <p>분포지역 : 중부이북에서 자란다.</p> <p>형태 : 여러해살이풀</p> <p>크기 : 줄기는 높이 20-60cm이다.</p> <p>꽃색 : 백색</p> <p>개화기 : 6월, 7월</p> <p>잎자루는 벗겨색 또는 적갈색이고 털과 더불어 좁은 비늘조각이 드문드문 있으며 위쪽 끝에 관절이 있다. 잎몸은 잎자루보다 길고 세모난 달걀 모양 또는 넓은 창 모양이다. 끝이 뾰족하고 밑부분이 거의 좁아지지 않는다. 윗부분은 1회 깃털 모양으로, 밑부분은 2회 깃털 모양으로 갈라지며 큰 잎자루에 털이 있다. 깃털 모양 조각은 달걀 모양 또는 달걀 같은 긴 타원 모양이다. 끝이 뾰족하고 가장자리가 깃털 모양으로 다시 얇게 갈라지거나 물결 모양의 톱니로 되어 있다. 양면에 털이 비교적 많고 윗부분의 것은 큰 잎자루로 흘러 서로 합쳐진다.</p> <p>흫씨주머니 무리는 가장자리 근처에 달리며 흑갈색이다. 흫씨주머니 무리를 덮고 있는 막은 불규칙하고 얇게 갈라지며, 갈라진 조각에는 털이 있다. 뿌리줄기는 짧고 비늘조각이 촘촘하게 나 있으며 잎이 모여나기한다. 바위틈에서 자란다. 참우드풀과 우드풀의 중간형이다.</p> |