



주름재주나방 / *Pterostoma sinicum* Moore, 1877

구분	설명
생물분류	곤충
속국명	주름재주나방속
과국명	재주나방과

과명	Notodontidae
일반특징	<p>몸과 날개는 황갈색이고, 앞날개에는 연한 갈색 무늬가 있다. 성장한 애벌레의 머리와 몸은 초록색을 띠며, 등은 하얀색이다. 등에는 어두운 초록색 선이 세로로 가늘게 나 있고, 양쪽이 하얀 선으로 둘러 싸여 있다. 몸의 옆면에는 황백색 띠가 뚜렷하게 있으며, 그 양쪽이 검은 선으로 되어 있다.</p> <p>1년에 두 번 볼 수 있다. 흙 속에서 번데기로 겨울을 지낸다. 그 후 5~6월에 첫 번째 성충이 나타나 앞 뒷면에 하나 혹은 여러 개의 알을 낳는다. 애벌레는 잎의 옆부터 먹으며, 7월 하순에는 성장을 마치고 흙 속에서 번데기가 된다. 7~8월에 두 번째 성충이 나타나고, 9월에 성장을 마친 애벌레는 땅 속에서 번데기가 되어 겨울을 난다. 한꺼번에 많이 나타나지는 않지만 어린 나무나 화초에 발생하기도 하므로 주의해야 한다.</p>