



주홍서나물 / *Crassocephalum crepidioides* (Benth.) S.Moore

구분	설명
생물분류	식물
속국명	주홍서나물속
과국명	국화과

<p>과명</p>	<p>Compositae</p>
<p>일반특징</p>	<p> 요약설명 : 국화과 한해살이풀로 제주도와 남부지방에 분포한다. 분포지역 : 제주도와 남부지방에 분포한다. 형태 : 한해살이풀 크기 : 높이 30-70cm 꽃색 : 백색, 붉은색 개화기 : 8월, 9월, 7월 잎은 어긋나고 잎자루가 있다. 아래쪽의 잎은 불규칙하게 깃털 모양으로 갈라진다. 또한, 달걀 모양 또는 긴 타원 모양이며 양 끝이 예두이다. 가장자리에는 크기가 다른 톱니가 있으며 양면에는 드문드문 털이 있다. 위쪽의 잎은 좁고 긴 타원 모양이며 양 끝이 길고 뾰족하다. 등성등성 톱니가 있다. 꽃은 7~9월에 피고, 머리모양꽃차례는 모두 아래를 향하여 매달리며 총상꽃차례를 이룬다. 총포는 원통 모양이며 밑부분 근처가 뚜렷하게 부풀어있다. 바깥쪽 총포 조각은 선 모양이고, 안쪽 총포 조각도 선모양이며 한 줄로 배열된다. 혀꽃은 없고 통 모양의 꽃은 긴 관처럼 생겼으며 판통은 하얀색이다. 판연은 붉은색이며 5개로 갈라진다. 씨방 위쪽에 달리는 털 모양의 돌기는 하얀색이며 판통보다 짧다. 암술머리는 2개로 갈라지고 끈모양이며 끝이 가늘어진다. 줄기는 곧게 서고 연약하며 가지가 갈라져 나온다. 또한, 털이 드문드문 있다. 1950년대 일본에도 귀화되었다. 국내에서는 1991년 전의식 씨에 의하여 남해도, 제주도, 부산에서 채집되어 보고된 바 있다. </p>