



줄점팔랑나비 / *Parnara guttatus* (Bremer et Grey, 1853)

구분	설명
생물분류	곤충
속국명	줄점팔랑나비속
과국명	팔랑나비과

과명	Hesperiidae
일반특징	<p>암수의 무늬에 큰 차이는 없다. 앞날개 가운데 부분에 수컷은 같은 크기의 흰 무늬가 2개 있는데, 암컷은 하나만 있는 경우가 있다. 날개는 암컷이 수컷보다 폭이 넓고, 흰 무늬가 크다. 확실히 구별하기 위해서는 배 끝을 조사하는 것이 바람직하다.</p> <p>중부 지방에서는 첫 시기의 성충들을 거의 볼 수 없지만, 가을이 되면 두 번째, 세 번째 시기에 성충이 된 개체수가 많아진다. 이 곳에서는 겨울을 나지 못하기 때문에, 봄에 적은 수의 나비들이 남쪽에서 중부 지방으로 이동해 와서, 가을이 되면 그 숫자가 많아지는 것으로 추측할 수 있다.</p> <p>마을이나 논, 밭과 하천 주변의 풀이 많은 곳에 서식한다. 사람이 사는 집의 정원에 피어 있는 국화, 메밀, 고마리 등 각종 꽃에서 꿀을 먹는다.</p>