

: 2025 11 6 8:43



쥐오줌풀 / Valeriana fauriei Briq.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	쥐오줌풀속
과국명	마타리과

과명	Valerianaceae
일반특징	요약설명: 마타리과 여러해살이풀로 꽃을 감상하기 위해 기르기도 한다. 전국 각지에서 재배하나, 제주도에서부터 북부의 산지 근처에서 자란다. 분포지역: 전국 각지에 재배되나, 제주도에서부터 북부지역의 산간부근에서 자란다. 형태: 숙근성 여러해살이풀로 관화식물이다. 크기: 높이 40~80cm. 꽃색: 붉은색 개화기: 5월,6월,7월,8월 처음에는 뿌리에서 나는 잎이 자라지만 꽃이 필 때에는 없어지고 줄기잎이 자란다. 줄기잎은 마주나기하고 깃모양겹잎이며 5~7개로 갈라진다. 갈라진조각에는 톱니가 있다. 넓은잎쥐오줌풀에 비하면 잎이 아주 좁다. 꽃은 5~8월에 붉은색으로 피고 가지 끝과 줄기 끝에 편평꽃차례로 달린다. 꽃잎 전체는 5개로 갈라진다. 꽃에서 통처럼 생긴 부분은 한쪽이 약간 부풀고 3개의 수술이 길게 꽃 밖으로 나온다. 열매는 창 모양이고 윗부분에 꽃받침이 솜털처럼 달려서 바람에 날린다. 줄기는 밑에서 뻗는 가지가 자라서 번식한다. 마디 부근에 길고 하얀 털이 있다. 뿌리줄기는 짧고 굵으며 잔뿌리가 드문드문 여러 방향으로 뻗어 있다. 뿌리에서 강한 향기가 난다. 산지의 약간 습한 곳이나 반그늘 또는 양지에서 잘 자란다. 전국 각지에서 재배되지만 차갑고 서늘한 산지의 기후가 가장 알맞다. 씨앗을 뿌리거나 포기나누기를 하여 번식시킨다.