



쥐털이슬 / *Circaea alpina* L.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	털이슬속
과국명	바늘꽃과

과명	Onagraceae
일반특징	<p>요약설명 : 바늘꽃과 여러해살이풀로 한국, 중국, 일본, 러시아 극동부에 분포한다.</p> <p>분포지역 : 한국, 중국, 일본, 러시아 극동부에 분포한다.</p> <p>형태 : 여러해살이풀</p> <p>크기 : 높이가 5-15cm정도로 자란다.</p> <p>꽃색 : 붉은색, 백색</p> <p>개화기 : 8월, 7월</p> <p>잎은 마주나고 세모난 심장 모양 또는 달걀 모양이다. 예두고 밑부분은 얇은 심장저거나 심장저와 비슷하다. 겉면과 가장자리에 잔털이 있고 뾰족한 톱니가 조금 있다. 잎자루에는 날개가 있고 붉은빛이 돈다.</p> <p>꽃은 7~8월에 홍백색으로 피고 줄기나 가지 끝의 총상꽃차례에 달린다. 꽃차례는 꽃이 진 다음 자라고 털이 없다. 꽃받침조각은 2개이고 붉은빛을 띤다. 꽃잎도 2개이고 하얀색이며, 거꿀달걀모양으로 끝이 오목하다. 꽃받침보다 조금 짧다. 수술은 2개, 암술은 1개이고 씨방은 꽃받침 밑에 있으며 갈고리 같은 털로 덮여 있다.</p> <p>열매는 단단한 껍질에 싸여 있고 거꿀달걀모양이다. 갈고리 가시가 있고 작은 열매자루가 있다.</p> <p>줄기는 곧게 서고 가늘다. 전체적으로 붉은빛을 띠며 털이 없고 밑부분에서 실 같은 기는줄기가 자란다. 그 끝에 겨울눈이 생긴다.</p> <p>깊은 산지역의 그늘지고 습한 곳에서 자란다. 세계에 약 12종이 있으며 우리나라에는 4종이 분포한다.</p>