

: 2025 11 6 9:24



지치 / Lithospermum erythrorhizon Siebold & Zucc.

구분	설명
생물 <del>분</del> 류	식물
속국명	지치속
과국명	지치과
과명	Boraginaceae
일반특징	요약설명: 지치과 여러해살이풀로 전국 각지에서 자란다. 일본, 중국, 러시아에도 분포한다. 분포지역: 일본, 중국, 러시아 / 한국(전역) 형태: 여러해살이풀 크기: 높이 30~70cm. 꽃색: 백색 개화기: 5월,6월 잎은 어긋나고 두꺼우며 잎자루가 없다. 창 모양이고 양 끝이 뾰족하다. 밑부분이 좁아져서 잎자루처럼 된다. 톱니가 없고 옆으로 갈라진 잎맥은 비스듬하게 뻗는다. 꽃은 5~6월에 하얀색으로 피고, 줄기나 가지 끝의 총상꽃차례에 달린다. 꽃이나 싹을 보호하는 잎 모양의 구조가 있다. 꽃받침조각은 5개로 깊게 갈라진다. 갈라진 조각은 선모양이고 둔두이며 판통보다 길다. 꽃잎 전체는 바퀴모양처럼 5개로 갈라진다. 또한, 대롱이 달리는 가운데 부분에 5개의 비늘 조각이 있다. 열매는 분과이고 회색이며 윤기가 난다. 줄기는 곧게 자란다. 원줄기는 가지가 갈라지고 털이 많다. 뿌리가 땅속 깊이 들어가며 크고 뚱뚱하다. 자주색을 띤다. 뿌리를 약재로 쓸 때, 자근()이라 한다.