



진홍가슴 / *Luscinia calliope*

구분	설명
생물분류	야생동물

속국명	
과국명	지빠귀과
과명	Turdidae
일반특징	<p>개울가, 골짜기의 키 작은 나무나 풀이 무성한 덩굴 등지에 찾아온다. 혼자 또는 암수가 함께 생활하며, 짝짓기철에는 일정한 자기 영역이 있다. 등지는 뾰족한 나뭇잎이 돌아나는 침엽수가 자라나는 땅의 풀밭 위에 마른 풀이나 가는 뿌리를 이용하여 둥근 모양으로 만든다. 알을 낳는 시기는 6월~8월 말이다. 알은 청록색으로 엷은 자주색의 얼룩점이 있으며, 3~5개 낳는다. 먹이는 곤충류, 각종 열매 등이다.</p> <p>수컷은 이마, 머리, 기타 몸 윗면이 어두운 다갈색이다. 긴 눈썹 선과 짧은 뺨 선은 흰색이다. 턱밑과 턱 아래 부위는 진한 붉은색이다. 목 옆과 윗가슴은 어두운 갈색을 띤 잿빛이며, 아랫가슴에서 옆구리로 가면서 잿빛이 도는 노란 갈색이 된다. 배의 중앙과 아래꼬리덮깃은 흰색으로 약간의 노란 갈색을 띤다. 여름철의 부리는 검은색이고, 가을과 겨울에는 어두운 갈색이다. 다리는 갈색 또는 어두운 갈색이다.</p>