



: 2026 2 23 5:56



Flora of Korea
Cyperaceae
Carex vaginata var. *petersii* (C. A. Mey. ex F. Schmidt) Akiyama
Local Name 집사초
Mt. Tae-gi, Sap-gye-ri, Dun-nae-myeon, Hoeng-seong-gun,
Gangwon-do, Korea
Date 22 May 2009
Collector Seong-Hyun Cho, Yong-In Kim
YoungdongKU TG-2009-0467
Herbarium of Hallym University (HCU)

집사초 / *Carex vaginata* var. *petersii* (C.A.Mey.) Akiyama

구분	설명
생물분류	식물
속국명	사초속
과국명	사초과
과명	Cyperaceae
일반특징	<p>요약설명 : 사초과 여러해살이풀로 우리나라의 북부지방에서 자란다.</p> <p>분포지역 : 북부지방에서 자란다.</p> <p>형태 : 여러해살이풀</p> <p>크기 : 높이는 20-50cm</p> <p>꽃색 : 갈색</p> <p>개화기 : 6월, 7월</p> <p>잎은 납작하고 밝은 초록색이며 꽂대보다 짧다. 밑부분의 잎집은 잎이 없고 연한 갈색이지만 일부분에 적자색이 돌며 섬유처럼 가늘게 갈라진다.</p> <p>작은 이삭은 2~4개가 서로 떨어져서 곧게 선다. 꼭대기의 작은 이삭은 수꽃이며 넓은 선모양이고 대가 있다. 꽂은 밑으로 갈수록 드문드문 달린다.</p> <p>암꽃 밑에 달린 2개의 작은 잎은 달걀 모양이며 짙은 갈색이 도는 진한 붉은색이거나 검은 적자색이다. 끝이 둔두 또는 예두며 뒷면 녹색 부분에 1개의 맥이 있다. 암술대는 곧고 밑부분이 약간 굽으며 끝이 3개로 갈라진다.</p> <p>열매를 싸고 있는 주머니는 포영보다 길고 비스듬하게 달리며 황록색에서 갈색으로 변한다. 또한 털이 없고 맥이 많으며 세모난 달걀 모양이다. 부리 끝은 진한 갈색을 띠며 2개로 갈라지지만 한쪽이 더 많이 파여 있다. 수과는 헐겁게 들어 있고 세모난 거꿀달걀모양이다.</p> <p>줄기는 가늘게 뻗는 것이 있어 그리 모여나지는 않는다.</p> <p>산지의 습한 풀밭에서 자란다.</p>