



짚레애기잎말이나방 / *Notocelia rosaecolana* (Doubleday, 1850)

구분	설명
생물분류	곤충
속국명	짚레애기잎말이나방속
과국명	잎말이나방과

과명	Tortricidae
일반특징	<p>아랫입술수염은 앞으로 뻗어 있지만, 끝 부분이 약간 위로 향해 있다. 제 2마디는 다소 커져 있고 제 3마디는 제 2마디의 비늘 조각에 덮여 잘 보이지 않는다. 앞날개는 흰색이고 날개가 시작되는 부분의 1/3은 회갈색이다. 가운데 부분의 뒤쪽은 선명하지만 앞쪽은 선명하지 않다. 뒷날개는 갈색이다. 수컷의 생식기는 파악판이 길고 쿠쿨루스는 긴 타원형이다. 옆돌기는 가늘고 길다. 삽입기는 짧고 양 끝이 뾰족한 원기둥 모양이며, 사정낭침은 여러 개이다. 암컷의 생식기는 시그눔이 2개이고 가느다란 바늘 모양이며 약간 구부러져 있다.</p> <p>5~6월에 나타나고 먹이 식물은 야생장미와 재배장미이다. 애벌레는 야생장미나 재배장미의 잎을 묶어 피해를 준다. 국내는 경기도, 충청남도, 국외는 일본, 중국, 러시아, 유럽에 분포한다.</p>