



차꼬리고사리 / *Asplenium trichomanes* L.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	꼬리고사리속
과국명	꼬리고사리과

과명	Aspleniaceae
일반특징	<p>요약설명 : 꼬리고사리과 상록다년초로 우리나라의 전라남도 신안군, 완도군, 해남군과 제주도에서 자란다. 중국에도 분포한다.</p> <p>분포지역 : 중국 / 한국(전라남도 신안군, 완도군, 해남군; 제주도)</p> <p>형태 : 상록다년초</p> <p>크기 : 높이 15-30cm</p> <p>꽃색 : 백색, 주황색</p> <p>개화기 : 5월</p> <p>잎자루는 흑갈색이고 윤기가 나며 양쪽에 매우 좁은 날개 또는 모가 진 선이 있다. 겉면은 평평하지만 뒷면은 도드라진다. 잎몸은 선 모양이고 점점 뭉뚝한 끝부분 쪽으로 좁아지지만 밑부분은 좁아지지 않는다. 큰 잎자루는 흑갈색이고 윤기가 나며 양쪽에 날개가 있다. 뒷면에는 날개가 없고 1회 깃털 모양으로 갈라진다. 거의 비슷한 깃조각이 달리고 진한 초록색이다. 깃조각은 타원 모양, 달걀 모양, 또는 긴 타원 모양이고 끝이 둥글며 밑부분은 넓고 뾰족하다.</p> <p>흩씨주머니 무리는 대부분 10개 이내가 두 줄로 달린다.</p> <p>뿌리줄기는 짧고 곧게 서며 마른 잎으로 덮인다.</p> <p>산중 바위틈이나 나무 그늘에서 자란다. 꼬리고사리와 비슷하지만 모여나기하는 잎자루가 차를 젖는 솔과 비슷하기 때문에 차꼬리고사리라고 한다.</p>