



참긴더듬이잎벌레 / *Pyrrhalta humeralis* (Chen, 1942)

구분	설명
생물분류	곤충
속국명	참긴더듬이앞벌레속
과국명	앞벌레과
과명	Chrysomelidae
일반특징	<p>몸은 연한 갈색이다. 더듬이는 검고 각 마디가 시작되는 부분은 연한 색이다. 머리에 1개, 가슴의 등쪽 면에 3개의 검은 점이 있다.</p> <p>애벌레는 노란색 또는 황갈색이고, 각 마디에 검은 점이 있다.</p> <p>알은 둥글고 황백색이다.</p> <p>먹이 식물의 겨울눈이나 가지에서 알의 형태로 겨울을 나며, 그 후 4월 중순쯤에 부화한다. 갓 태어난 애벌레는 새 잎을 잎맥만 남기고 갹아 먹는다. 5월 중~하순에는 낙엽 밑이나 흙 속에서 번데기가 된다. 6월 상~중순쯤에는 성충이 나타나며 9월 중순부터 늦가을까지 햇가지, 잎의 꼭지, 겨울눈의 조직 내에 10개씩 무더기로 알을 낳는다.</p> <p>성충 때문에 생기는 피해는 7월 상순~8월 상순에 많으며, 애벌레와 동시에 피해를 준다. 나무가 죽지는 않지만, 피해 부분이 갈색으로 변하기 때문에 보기에 좋지 않다.</p>