❤_어린이 생물도감

: 2025 11 6 9:34



참나무겨우살이 / Taxillus yadoriki (Siebold) Danser

구분	설명
생물분류	식물
속국명	참나무겨우살이속
과국명	꼬리겨우살이과

과명	Loranthaceae
일반특징	요약설명 : 꼬리겨우살이과 상록 기생 관목으로 우리나라의 제주도에서 자라며 일본에도 분포한다. 분포지역 : 일본 / 한국(제주도) 형태 : 상록 기생 관목 크기 : 높이 40~60㎝,지름이 1㎜에 달하는 것도 있다. 꽃색 : 갈색,자주색 개화기 : 10월,6월,7월 입은 마주나기하거나 어긋나기도 한다. 넓은 타원 모양 또는 달걀 같은 둥근모양, 거꾸로 선 달걀 같은 둥근모양이며, 둔두 원저이다. 가장자리는밋밋하고 겉면에 털이 없으며 뒷면에 적갈색의 퍼진 털이 촘촘히 나 있다. 10월쯤 2~3개의 꽃자루가 있는 꽃이 핀다. 암술과 수술을 모두 갖고 있는양성꽃이다. 꽃봉오리는 활처럼 굽으며 꽃뎦이는 좁은 달걀 같은 통모양이다. 겉에 적갈색의 퍼진 털이 있으며 안쪽은 흑자색으로 광택이 난다. 끝이 4개의 주걱모양 조각으로 갈라져서 뒤로 젖혀진다. 수술은 4개이고꽃덮이의 밑부분에서 마주나기한다. 씨방은 둥근모양이고 꽃받침 밑에 있다. 암술대는 꽃덮이 통 밖으로 나와서 위로 굽는다. 열매는 장과고 타원 모양이며 겨울을 나고 노란색으로 익는다. 적갈색의 퍼진털이 있으며 열매의 살은 끈적끈적하다. 구실잣밤나무, 동백나무, 후박나무 및 육박나무에 기생하고 보리수나무와 비슷하다. 겨울에는 새들이 열매를 쪼아 먹기 위해 열매의 살을 파헤친다. 이때에 씨앗이 나무에 붙거나, 새의 똥과 함께 배설된 씨앗이 나뭇가지에 불어 자연적으로 번식한다. 씨앗은 싹이 튼후 5년이 지나야 잎이 나온다.