

: 2025 11 5 10:49



참바늘골 / Eleocharis attenuata f. laeviseta (Nakai) H. Hara

구분	설명
생물분류 -	식물
속국명	바늘골속
과국명	사초과

과명	Cyperaceae
일반특징	요약설명: 사초과 한해살이풀로 제주도, 전라남도 완도에서 자라며 일본에도 분포한다. 분포지역: 제주, 전남(완도)에 나며 일본에 분포한다. 형태: 한해살이풀 크기: 높이 25~55cm, 지름 1mm 정도이다. 꽃색: 녹색 개화기: 8월,7월 잎은 퇴화하여 잎집이 되고 줄기의 밑부분을 감싸며 윗부분은 적갈색이다. 꽃은 7~10월에 피고 1개의 작은 이삭이 줄기 끝에 달린다. 작은 이삭은 달걀 모양이고 꽃이 촘촘히 달려 있으며 밑부분 가까이가 가장 넓고 연한 갈색이다. 비늘조각은 넓은 달걀 모양이며 얇은 막처럼 되어 있다. 끝이 뭉뚝하며 색이 연하고 1개의 굵은 맥이 있다. 열매는 수과고 네모난 거꿀달걀 모양이다. 황갈색이고 윤기가 난다. 암술대는 밑부분이 압축된 세모난 모양이며 수과보다 좁다. 바늘가시가 6개이고 수과보다 약간 길다. 줄기는 모여나기하고 가느다란 원기둥 모양이다. 뿌리줄기는 거의 발달하지 않고 기는줄기가 없다. 햇볕이 잘 드는 습한 풀밭에서 자란다.