



: 2026 2 4 8:57



2012년도 식물·곤충
표본정보 DB구축 사업

KOREA NATIONAL HERBARIUM (KH)	
Oct. 18. 2010 ESJeon102852	Flora of Korea
Cyperus microiria Steud.	
Cyperaceae	급발동사니
loc. Mt.Noja-san, Geoje-si, Gyeongsangnam-do 경상남도 거제시 노자산	
GPS 국가생물자원보호를 위해 강세화표본은 차단되었습니다. alt. 177m	
note.	
col. Jeon,Eui-Sik	
det. Jeon,Eui-Sik	
Distribution of the Korean Native Species, 2010	

참방동사니 / *Cyperus iria* L.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	방동사니속
과국명	사초과
과명	Cyperaceae
일반특징	<p>요약설명 : 사초과 한해살이풀로 전국 각지에서 자란다.</p> <p>분포지역 : 전국 각처에 분포한다.</p> <p>형태 : 한해살이풀이다.</p> <p>크기 : 높이는 20~30cm이다.</p> <p>꽃색 : 노란색</p> <p>개화기 : 8월, 9월, 10월</p> <p>줄기 밑부분에 2~3개의 잎이 어긋난다.</p> <p>꽃은 8~10월에 피고 꽃차례는 줄기 끝에 달린다. 꽃이나 쌍을 보호하는 잎과 같은 구조는 4~5개가 있는데, 그중 2~3개는 꽃차례보다 길다. 가지는 3~5개이다. 꽃이삭은 대부분 옆으로 기울며 달걀 같은 타원 모양이다.</p> <p>노란색의 작은 이삭이 많이 달린다. 작은 이삭은 선같이 긴 타원 모양이고 평평하다. 또한, 연한 노란색이고 10~20개의 꽃이 달린다. 비늘조각은 넓은 거꿀달걀모양이고 둥근 끝에 뾰족한 돌기가 있다. 굵은 맥은 초록색이고 곧게 선다. 암술대는 짧고 끝이 3개로 갈라진다.</p> <p>열매는 수과고 세모나며 비늘조각보다 짧다.</p> <p>줄기는 다소 모여난다. 뭉뚱한 삼각 기둥 모양이며 깃깃하고 초록색이다.</p> <p>뿌리줄기는 없고, 보라색의 수염뿌리가 있다.</p> <p>논,밭의 주변이나 볕이 잘 드는 풀밭의 습지에서 잡초로 흔하게 자란다. 식물 전체에서 특유의 향기가 난다.</p>