

_어린이 생물도감

: 2026 2 8 1:42



참으아리 / *Clematis terniflora* DC.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	으아리속
과국명	미나리아재비과

과명	Ranunculaceae
일반특징	<p>요약설명 : 미나리아재비과 낙엽 활엽 만경목으로 우리나라의 중부지방을 기준으로 한 남쪽 지역에서 자란다. 특히 울릉도를 비롯한 바닷가에 가까운 산과 들에 많다. 일본, 중국, 대만에도 분포한다.</p> <p>분포지역 : ►일본, 중국, 대만에도 분포한다. ►중부이남 지역에서 자란다. 특히 울릉도를 비롯한 바닷가에 가까운 산야에 많다.</p> <p>형태 : 낙엽 활엽 만경목</p> <p>크기 : 길이가 5m 정도로 자란다.</p> <p>꽃색 : 백색</p> <p>개화기 : 7월, 8월, 9월</p> <p>잎은 마주나기하며 3~7개의 작은 잎으로 이루어진 깃모양겹잎이다. 작은 잎은 달걀 모양, 넓은 달걀 모양 또는 창 모양이다. 또한 끝이 짧고 뾰족하거나 둔두며 원저 또는 심장저와 비슷한 모양이다. 양면에 털이 없고, 가장자리에 대부분 톱니가 없지만 가끔 결각상이다. 잎자루는 구부러져 덩굴과 같은 역할을 한다.</p> <p>꽃은 7~9월에 하얀색으로 피고, 줄기나 가지 끝 혹은 잎 달린 자리에서 원뿔모양꽃차례 또는 츠산꽃차례를 이룬다. 꽃차례에는 많은 꽃이 피어 뒤덮으며 향기가 있다. 꽃잎처럼 보이는 것은 꽃받침인데, 꽃받침 잎은 4개로 긴 타원 모양이다. 곁에 털이 거의 없고, 수술대는 꽃가루주머니보다 길다. 열매는 수과고 잔털이 있다. 열매에 달려 있는 긴 암술대도 털이 돌아 깃털 모양처럼 보인다.</p> <p>덩굴 줄기는 가늘며, 어릴 때는 털이 있다가 커서 없어진다.</p> <p>흰빛이 도는 연한 갈색의 잔뿌리가 여러 방향으로 고르게 많이 나와 있다.</p> <p>산기슭 아래에서 흔히 자란다. 습기가 적당한 곳을 좋아하며 건조에 견디는 힘과 여러 환경에 적응하는 힘이 강하다. 시설이나 지붕이 없는 보통 땅에서 겨울을 나고 16~30°C에서 잘 자란다. 씨앗을 뿌리거나 꺾꽂이, 휙묻이 등의 방법으로 번식시킨다.</p>