

: 2026 2 23 2:10



참줄나비사춘 / *Limenitis amphyssa* Menetries, 1859

구분	설명
생물분류	곤충
속국명	줄나비속
과국명	네발나비과

과명	Nymphalidae
일반특징	<p>참줄나비와 비슷하게 생겼지만 크기가 더 작고 앞날개 중실이 시작되는 부분에 자 모양의 흰 무늬가 있다. 또한 앞날개 아랫면의 중실이 시작되는 부분과 끝부분에 하얀 무늬가 있는데, 참줄나비는 두 무늬의 사이가 삼각형이지만, 이 나비는 긴 사각형이다. 참줄나비는 뒷날개 윗면 가운데에 있는 흰 띠가 아래로 휘어져 있지만 이 나비는 직선에 가깝다.</p> <p>암컷은 오후에 먹이 식물의 잎 뒷면에다가 알을 하나씩 낳는다. 강원도 산지에 주로 서식하며 참줄나비보다 범위가 좁다. 수컷은 맑은 날 오후에 나뭇잎 위에서 구역을 지키려는 점유 행동을 하며, 가끔 습지나 개울가 바위에 내려앉거나 새똥에도 잘 모인다. 꽃에서 꿀을 먹는 모습은 아직 발견되지 않았다. 애벌레의 모습으로 겨울을 난다.</p>