



천궁 / Cnidium officinale Makino

| 구분 | 설명 |
|------|-------|
| 생물분류 | 식물 |
| 속국명 | 기름당귀속 |
| 과국명 | 산형과 |

| | |
|------|---|
| 과명 | Umbelliferae |
| 일반특징 | <p>요약설명 : 산형과 여러해살이풀로 전국 각지에서 재배한다.</p> <p>분포지역 : 전국 각지에서 재배한다.</p> <p>형태 : 여러해살이풀</p> <p>크기 : 높이 30~60cm이다.</p> <p>꽃색 : 백색</p> <p>개화기 : 9월,8월</p> <p>잎은 어긋나고 2회 깃모양겹잎이다. 뿌리에서 난 잎은 잎자루가 길고 줄기잎은 위로 갈수록 점점 작아진다. 밑부분이 잎집이 되어 원줄기를 감싼다. 작은 잎은 달걀 모양 또는 창 모양이며 결각상의 톱니 또는 날카로운 톱니가 있다.</p> <p>꽃은 8~9월에 하얀색으로 피고 줄기나 가지 끝에 겹우산모양꽃차례로 달린다. 큰 우산 모양 꽃줄기는 10개 내외이고 작은 것은 15개이다. 총포와 작은 총포는 각각 5~6개이고 선모양이다. 꽃잎 전체는 작은 편이고 꽃잎은 5장이며 안으로 굽는다. 5개의 수술과 1개의 암술, 1개의 씨방이 있다.</p> <p>열매는 달걀 모양이고 익지 않는다.</p> <p>줄기는 곧게 서고 갈라진다.</p> <p>뿌리줄기는 크고 뚱뚱하여 약간 염주 모양이다.</p> <p>우리나라 각지에서 재배할 수 있다. 여름철에 서늘하고 아침 안개가 잘 끼는 산지 농촌의 습기가 적당하다. 물이 잘 빠지는 밭이 제일 적합하다. 흙이 차지고 물이 잘 안 빠지는 곳은 장마 때 뿌리가 썩을 수 있다. 꽃이 피기는 하지만 열매가 맺히지 않으므로 뿌리를 나누어 번식시킨다.</p> |