



청괴불나무 / *Lonicera subsessilis* Rehder

구분	설명
생물분류	식물
속국명	인동속
과국명	인동과

과명	Caprifoliaceae
일반특징	<p>요약설명 : 인동과 낙엽 활엽 관목으로 평안남도에서 전라남도까지 주로 백두대간에 분포한다.</p> <p>분포지역 : 평안남도에서 전라남도까지 주로 백두대간 분포.</p> <p>형태 : 낙엽 활엽 관목.</p> <p>크기 : 높이 2m.</p> <p>꽃색 : 노란색,백색</p> <p>개화기 : 6월</p> <p>잎은 마주나기하고 달걀 모양, 예두이고 원저 또는 뾰족한 모양이다. 양면에 털이 없고 가장자리는 밋밋하다. 잎자루에는 털이 없다.</p> <p>꽃은 6월에 새가지의 잎겨드랑이에 달리고 포(꽃이나 싹을 보호하는 잎 같은 구조)는 날꽃 밑에 있는 작은 포보다 짧으며 달걀 모양이고 분비물을 내보내는 샘이 있다. 작은포는 서로 합쳐져서 접시 모양이 된다. 꽃잎 전체는 하얀색 또는 연한 노란색이고 윗부분이 3개로 갈라지며 판통보다 길다.</p> <p>판통은 밑부분이 굽다.</p> <p>열매는 둥글고 붉은색이며 윗부분까지 합쳐진다. 8월 말~9월 중순에 익는다.</p> <p>어린 가지는 자갈색이 돌며 털이 없다.</p> <p>깊은 산지역의 숲 속에서 자란다. 건조한 곳보다 습기가 적당한 곳을 좋아하며 음지나 양지 모두에서 잘 자란다. 바닷가나 도시 중심지에서도 생장이 양호하다. 씨앗을 뿌리거나 꺾꽂이를 하여 번식시킨다. 줄기가 훼손되었을 때 새로운 줄기를 만들어내는 능력이 뛰어나 가지가 뻗뻗하게 있다. 국내에만 나고 자라는 특산 식물이다.</p>