

: 2025 12 21 7:20



청까마귀머루 / *Vitis ficifolia* f. *glabrata* (Nakai) W.T.Lee

구분	설명
생물분류	식물
속국명	포도속
과국명	포도과

과명	Vitaceae
일반특징	<p>요약설명 : 포도과 낙엽 만경목으로 우리나라의 중부 지방을 기준으로 하여 남쪽 지역에서 자란다.</p> <p>분포지역 : 중부 이남.</p> <p>형태 : 낙엽만경.</p> <p>크기 : 길이 2m</p> <p>꽃색 : 녹색</p> <p>개화기 : 7월</p> <p>잎은 어긋나고 둥글며, 3~5개로 깊게 갈라지고 예두 심장저이다. 갈라진 조각은 다시 갈라지고 겉면에 털이 없으며 뒷면 맥 위에만 털이 촘촘히 나 있다. 가을철에 잎이 붉게 물든다.</p> <p>꽃은 7월에 연한 황록색으로 피고 원뿔모양꽃차례를 이룬다. 꽃차례는 잎과 마주나기하며 잎보다 짧다. 또한 꽃자루에서 덩굴손이 발달하며 털이 있다. 꽃받침은 바퀴 모양이다. 꽃잎은 5장이며 끝이 합쳐지지만 밑부분이 갈라져서 떨어진다. 열매는 장과이고 9~10월에 자흑색으로 익는다. 2~3개의 씨앗이 들어 있다.</p> <p>줄기는 나무에 기어 올라가거나 땅 위로 뻗는다. 어린 부분은 뾰족한 모서리가 있으며 분비샘이 발달한 적갈색의 털로 덮여 있다.</p>