



: 2026 2 23 3:31



청띠신선나비 / *Nymphalis canace* (Linnaeus, 1763)

구분	설명
생물분류	곤충
속국명	청띠신선나비속
과국명	네발나비과

과명	Nymphalidae
일반특징	<p>암수의 색이나 무늬는 차이가 적기 때문에 구별하기 위해서는 배 끝을 살펴봐야 한다. 여름형은 날개 아랫면에 검은색, 갈색, 청백색의 가느다란 무늬가 많고, 색의 질고 열음이 분명하다. 반면 가을형은 흑갈색을 띠고 색의 질고 열음의 차이가 적다.</p> <p>성장을 마친 애벌레의 몸은 원통형이고, 자흑색이다. 또한 그물 모양 무늬가 있으며 길고 큰 황백색의 다발 모양 돌기가 있다.</p> <p>보통 1년에 두 번 나타난다. 6월 초, 첫 번째 시기의 성충이 나타나기 시작해서 10월까지 지역에 따라 1~2회 계속 발생한다. 성충의 모습으로 겨울을 나고 다음 해 4월 중순~5월 하순까지 볼 수 있다. 참나무류의 나무즙이나 썩은 과일에 잘 모이며, 길 위나 나무 줄기에는 앓지만 꽃에는 오지 않는다. 먹이 식물의 잎이나 눈에 알을 하나씩 낳는다.</p> <p>어린 애벌레는 잎 뒷면에서 긴 타원형의 구멍을 뚫으면서 먹지만 성장하면 잎 가장자리부터 먹는다. 네 번 허물을 벗고 성장을 마친 애벌레가 되면 잎 뒷면이나 가지에서 번데기가 된다.</p>