

: 2025 11 8 4:32



청띠신선나비 / Nymphalis canace (Linnaeus, 1763)

| 구분 | 설명 |
|------------------|---------|
| 생 물분류 | 곤충 |
| 속국명 | 청띠신선나비속 |
| 과국명 | 네발나비과 |

https://www.korea-index.com/photo

| 과명 | Nymphalidae |
|------|---|
| 일반특징 | 암수의 색이나 무늬는 차이가 적기 때문에 구별하기 위해서는 배 끝을 살펴봐야 한다. 여름형은 날개 아랫면에 검은색, 갈색, 청백색의 가느다란 무늬가 많고, 색의 짙고 옅음이 분명하다. 반면 가을형은 흑갈색을 띠고 색의 짙고 옅음의 차이가 적다. 성장을 마친 애벌레의 몸은 원통형이고, 자흑색이다. 또한 그물 모양 무늬가 있으며 길고 큰 황백색의 다발 모양 돌기가 있다. 보통 1년에 두 번 나타난다. 6월 초, 첫 번째 시기의 성충이 나타나기 시작해서 10월까지 지역에 따라 1~2회 계속 발생한다. 성충의 모습으로 겨울을 나고 다음 해 4월 중순~5월하순까지 볼 수 있다. 참나무류의 나무즙이나 썩은 과일에 잘 모이며, 길 위나 나무 줄기에는 앉지만 꽃에는 오지 않는다. 먹이 식물의 잎이나 눈에 알을 하나씩 낳는다. 어린 애벌레는 잎 뒷면에서 긴 타원형의 구멍을 뚫으면서 먹지만 성장하면 잎 가장자리부터 먹는다. 네 번 허물을 벗고 성장을 마친 애벌레가 되면 잎 뒷면이나 가지에서 번데기가 된다. |