



청띠제비나비 / *Graphium sarpedon* (Linnaeus, 1758)

구분	설명
생물분류	곤충
속국명	청띠제비나비속
과국명	호랑나비과

과명	Papilionidae
일반특징	<p>앞, 뒷날개의 중심에는 파란색의 뚜렷한 줄무늬가 있다. 봄형은 여름형보다 작고 파란 띠의 폭이 넓다. 수컷의 뒷날개는 안쪽 가장자리가 말려 있는데, 그 속에는 연한 갈색의 긴 털이 모여 있다. 반면, 암컷은 없다.</p> <p>제주도와 남해안 섬에 있는 상록활엽수림 또는 사찰, 공원 주변에 서식한다. 1년에 두 번, 봄형은 5월쯤, 여름형은 6월~9월에 걸쳐 나타난다.</p> <p>수컷은 축축한 땅에 무리 지어 물을 먹는 경우가 많으며 나비길을 만든다. 아침 일찍 또는 오후 늦게 암수 모두 누리장나무, 아카시아나무, 엉겅퀴, 토끼풀 등의 꽃에서 꿀을 먹는다. 암컷은 밝은 곳에 있는 먹이 식물의 잎 뒷면이나 줄기에 날개로 알을 낳는다. 애벌레는 잎의 겉쪽에서 생활하며 번데기는 잎 뒷면이나 가지에서 볼 수 있다. 번데기의 모습으로 겨울을 난다.</p>