

_어린이 생물도감

: 2026 2 24 3:06



청띠제비나비 / *Graphium sarpedon* (Linnaeus, 1758)

구분	설명
생물분류	곤충
속국명	청띠제비나비속
과국명	호랑나비과

과명	Papilionidae
일반특징	<p>앞, 뒷날개의 중심에는 파란색의 뚜렷한 줄무늬가 있다. 봄형은 여름형보다 작고 파란 띠의 폭이 넓다. 수컷의 뒷날개는 안쪽 가장자리가 말려 있는데, 그 속에는 연한 갈색의 긴 털이 모여 있다. 반면, 암컷은 없다.</p> <p>제주도와 남해안 섬에 있는 상록활엽수림 또는 사찰, 공원 주변에 서식한다.</p> <p>1년에 두 번, 봄형은 5월쯤, 여름형은 6월~9월에 걸쳐 나타난다.</p> <p>수컷은 축축한 땅에 무리 지어 물을 먹는 경우가 많으며 나비길을 만든다.</p> <p>아침 일찍 또는 오후 늦게 암수 모두 누리장나무, 아카시아나무, 엉겅퀴, 토끼풀 등의 꽃에서 꿀을 먹는다. 암컷은 밝은 곳에 있는 먹이 식물의 잎 뒷면이나 줄기에 낱개로 알을 낳는다. 애벌레는 잎의 곁쪽에서 생활하며 번데기는 잎 뒷면이나 가지에서 볼 수 있다. 번데기의 모습으로 겨울을 난다.</p>