



청시닥나무 / *Acer barbinerve* Maxim.

---

구분	설명
생물분류	식물
속국명	단풍나무속
과국명	단풍나무과
과명	Aceraceae
일반특징	<p>요약설명 : 단풍나무과 낙엽 활엽 소교목으로 우리나라의 함경도, 평안도, 강원도, 전라남도 등의 백두대간에서 자란다. 중국과 극동러시아에도 분포한다.</p> <p>분포지역 : 중국, 극동러시아; 함경남북도, 평안남북도, 강원도, 전라남도 등 백두대간.</p> <p>형태 : 낙엽 활엽 소교목.</p> <p>크기 : 높이 10m.</p> <p>꽃색 : 녹색</p> <p>개화기 : 6월, 5월</p> <p>잎은 마주나기하고 넓은 달걀 모양이며 5개로 갈라진다. 점첨두, 심장저와 비슷한 모양 또는 절저이다. 겉면에 털이 거의 없으며 가장자리에 겹톱니가 있다. 갈라진 잎 조각 끝에 톱니가 있고 잎자루에는 잔털이 있다. 노란색으로 단풍이 진다.</p> <p>꽃은 6월에 피고 가지 끝의 총상꽃차례에 4~7개씩 달린다. 암꽃과 수꽃은 각각 다른 그루에서 핀다. 꽃대에는 털이 드문드문 나 있다. 암꽃은 새 가지 끝에서 나오고 수꽃은 지난해 가지 끝에 나온다. 꽃잎은 4장으로 거꾸로 선 달걀 같은 타원 모양이며 황록색이다.</p> <p>열매는 시과이고 직각 또는 직각보다 큰 각으로 벌어진다. 주름살이 많고 날개가 창 모양이다. 9월 중순~10월 초에 익는다.</p> <p>나무껍질은 회갈색이며 평평하고 넓다. 어린 가지는 누런빛이 돌지만 간혹 붉은색인 것도 있으며 털이 있다.</p> <p>깊은 산 숲 밑에서 자라며 씨앗으로 번식한다.</p>