



청피사초 / *Carex macrandrolepis* H.L v. & Vaniot

| 구분   | 설명  |
|------|-----|
| 생물분류 | 식물  |
| 속국명  | 사초속 |
| 과국명  | 사초과 |

|      |   |
|------|---|
| 과명   | Cyperaceae  |
| 일반특징 | <p>요약설명 : 사초과 여러해살이풀로 제주도의 법환동과 대정읍 사이 지역에서 자란다.</p> <p>분포지역 : 제주 법환동과 대정읍의 사이지역에서 자란다.</p> <p>형태 : 여러해살이풀</p> <p>크기 : 높이는 15-40cm</p> <p>꽃색 : 자주색</p> <p>개화기 : 7월,8월,6월</p> <p>잎은 평평하고 밝은 초록색이며 밑동의 잎집은 흑갈색의 섬유처럼 가늘게 갈라진다.</p> <p>작은 이삭은 3~4개이고 떨어져 있지만 윗부분의 것은 가까이 있다. 꼭대기의 작은 이삭은 수꽃이고 선 모양이다. 옆쪽 작은 이삭은 암꽃이며 긴 대로 곧게 선다. 꽃이나 싹을 보호하는 작은 잎은 밑부분이 통처럼 되어 있다. 암꽃 밑의 2개의 작은 잎은 거꿀달걀모양이고 끝이 둥글거나 오목하다. 또한 연한 색이나 갈색이 돌고, 뒷면 녹색 부분에 있는 3개의 맥이 뚜렷하지 않다.</p> <p>암술대는 밑부분이 굽고 암술머리는 3개이다.</p> <p>열매를 싸고 있는 주머니는 뭉뚝하게 세모난 마름모꼴이다. 약간의 잔털과 더불어 뚜렷하지 않은 맥이 있다. 부리 끝은 하얗고 얇은 막처럼 되어 있으며 2개로 갈라진다. 수과는 주머니와 마찬가지로 세모난 마름모꼴이며 각 면이 세로로 오목해진다.</p> <p>줄기는 모여나고 옆으로 뻗는 줄기가 있다. 모양은 세모나며 털이 없다.</p> <p>뿌리줄기는 가지를 뻗는다.</p> <p>풀밭에서 자란다.</p> |