



: 2026 2 9 10:43



총대승마 / *Cimicifuga simplex* (DC.) Turcz.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	노루삼속
과국명	미나리아재비과

과명	Ranunculaceae
일반특징	<p>요약설명 : 미나리아재비과 여러해살이풀로 전국 각처의 깊은 산 지역에서 자란다. 중국, 몽골, 러시아 극동부에도 분포한다.</p> <p>분포지역 : ►한국, 중국, 몽골, 러시아 극동부에 분포한다. ►전국 각처의 심산지역에서 자란다.</p> <p>형태 : 여러해살이풀</p> <p>크기 : 높이가 1m 가량 된다.</p> <p>꽃색 : 백색</p> <p>개화기 : 8월, 7월, 6월</p> <p>잎은 어긋나고 2~3회로 3개씩 갈라진다. 작은 잎은 달걀 모양 또는 좁은 달걀 모양이다. 또한 3개로 갈라지기도 하고 가장자리에 결각상의 불규칙한 톱니가 있다. 곁면은 텔이 없으나 뒷면은 맥 위에 텔이 드문드문 있다.</p> <p>꽃은 6~7월에 피고 원줄기 끝에서 총상꽃차례로 달린다. 꽃차례는 흔히 밑부분에서 가지가 갈라지기도 하며 하얀꽃이 많이 달린다. 암술과 수술을 모두 갖고 있는 양성꽃과 수꽃이 있으며 하얀 텔이 있다. 꽃받침조각은 5개이고 타원 모양이다. 꽃잎은 작고 끝이 뾰족하거나 얇게 2개로 갈라진다. 수술은 많고 하얀색이다. 씨방은 2~7개이고 꽃이 핀 다음 길어지는 짧은 대가 있으며 텔이 약간 있다. 암술은 3~6개이고 회색텔과 분비샘이 발달한 텔이 나타난다.</p> <p>열매는 골돌과고 긴 대가 있다. 텔이 약간 있거나 없고 긴 타원 모양이다. 끝에 꼬부라진 암술대가 남아있다.</p> <p>줄기에는 하얀 텔이 있다.</p> <p><u>깊은 산지의 그늘에서 자란다. 독이 있는 식물이다.</u></p>