

: 2025 11 7 10:31



칠보치마 / Metanarthecium luteoviride Maxim.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	칠보치마속

과국명	백합과
과명	Liliaceae
일반특징	요약설명: 백합과 여러해살이풀로 우리나라의 경기도 수원시, 경상남도 남해군에서 자란다. 일본에도 분포한다. 분포지역: 일본 / 한국(경기도 수원시; 경상남도 남해군) 형태: 여러해살이풀 크기: 꽃대는 높이 20~40cm 꽃색: 노란색, 백색 개화기: 6월,7월 잎은 뿌리에서 10여 개가 나와 여러 방향으로 퍼진다. 황록색을 띠고 거꿀피침모양이다. 밑으로 갈수록 점점 좁아지고 끝부분은 갑자기 뾰족해진다. 10개 정도의 맥이 있다. 꽃은 6~7월에 피고, 꽃대에 1~2개의 가지가 있으나 잎은 없다. 이삭꽃차례는 잔털이 있고, 꽃을 보호하는 잎과 같은 구조는 선모양이다. 꽃덮이조각은 6개이고 창 모양이며 끝이 뭉뚝하고 황백색을 띤다. 수술은 6개이고 꽃덮이보다 짧다. 수술대는 밑부분이 약간 넓으며 꽃덮이에 붙어 있다. 씨방은 꽃받침 옆에 붙어 있다. 열매는 삭과고 달걀 모양이며 암술대가 달려 있다. 꽃덮이도 남아서 열매를 둘러싸며, 씨앗은 달걀 모양이다. 뿌리줄기는 짧고 곧다. 수원 칠보산의 약간 습기가 있는 곳에서 처녀치마와 함께 자란다.